

MANTA* GOLD

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro,
segale, orzo, avena, triticale,
efficace contro le infestanti a foglia larga.

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione di MANTA GOLD

FLUROXIPIR meptil puro (= 86,5 g/l, pari a 60 g/l di fluroxipir acido)	g. 8,19
CLOPIRALID puro	g. 2,21 (= 23,3 g/l)
MCPA 2-etil-esil estere puro (= 416,1 g/l, pari a 266,7 g/l di MCPA acido)	g. 39,4
Coformulanti e solventi q.b. a	g. 100
Contiene: Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene	



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H315:** Provoca irritazione cutanea. **H317:** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H410:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH066:** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. **EUH401:** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P261:** Evitare di respirare gli aerosol. **P270:** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P273:** Non disperdere nell'ambiente. **P280:** Indossare indumenti protettivi/Proteggere gli occhi e il viso. **P301+P310:** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P302+P352:** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P305+P351+P338:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P331:** Non provocare il vomito. **P391:** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501:** Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscienze Italia s.r.l. – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona
Tel. +39 0372 709900

Distribuito da: SYNGENTA ITALIA S.p.A. – Viale Fulvio Testi, 280/6 – (MI) – Italia – Tel. 02-334441

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento

Corteva Agriscienze France S.A.S. - Drusenheim - Francia
Corteva Agriscienze France S.A.S - Cernay - Francia
Corteva Agriscienze Italia s.r.l. – Mozzanica (BG) – Italia
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO) – Italia
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT) - Italia
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) – Italia
SINTECO LOGISTICS S.p.A.- San Giuliano Milanese (MI) – Italia
(solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 1 - 3 - 5 - 10 litri

Registrazione n. 8139 del 30/12/1992 del Ministero della Sanità.

Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Usare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione/carico e applicazione del prodotto. Non rientrare nelle zone trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Usare guanti adatti durante le attività di rientro nelle colture trattate. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m da vegetazione naturale o, in alternativa, utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono del 50% la deriva.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattati di associazione delle seguenti sostanze attive: Fluroxipir 6%, Clopiralid 2,3%, MCPA 26,7%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Fluroxipir: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose; organo bersaglio: fegato e rene.

Clopiralid.

MCPA: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miopia. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.

Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MANTA GOLD è un'erbicida selettivo destinato al diserbo di post-emergenza di **frumento (tenero e duro), orzo, segale, avena e triticale.**

MANTA GOLD è particolarmente attivo contro: assenzio (*Artemisia spp.*), attaccamano (*Galium aparine*), borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), canapetta (*Galeopsis tetrahit*), centocchio comune (*Stellaria media*), cardo mariano (*Silybum marianum*), centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), crisantemo (*Chrysanthemum segetum*), erba morella (*Solanum nigrum*), erba stoma (*Thlaspi arvense*), falsa ortica (*Lamium spp.*), fiordaliso (*Centaurea cyanus*), fumaria (*Fumaria officinalis*), non ti scordar di me (*Myosotis arvensis*), papavero (*Papaver rhoeas*), poligono convolvolo (*Polygonum convolvulus*), ravello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), romice (*Rumex spp.*), senape (*Sinapis arvensis*), veccia (*Vicia spp.*), stoppione (*Cirsium arvense*), veronica (*Veronica spp.*), vilucchio (*Convolvulus arvensis*).

MANTA GOLD si applica alla dose di 2,5-3 litri per ettaro, dall'accostimento al secondo nodo della coltura. La dose più alta va usata in presenza di basse temperature (meno di 10° C medi giornalieri) e di infestazioni «difficili» quali borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), camomilla comune (*Matricaria Chamomilla*), papavero (*Papaver rhoeas*), veronica (*Veronica arvensis*).

E' consentito 1 solo trattamento per stagione.

Il trattamento è da eseguire utilizzando 200-400 litri d'acqua a ettaro avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti.

COMPATIBILITÀ

Nell'eventuale miscela con altri prodotti accertarsi preventivamente della compatibilità degli stessi.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi, floreali in genere, ecc. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di deriva portata dal vento.

MANTA GOLD non consente la trasemina delle leguminose.

Non seminare soia su terreno sodo in rotazione con cereali trattati con MANTA GOLD.

Si consiglia di non utilizzare compost e letame provenienti da paglia e sfalci di prati trattati con MANTA GOLD per coltivare orticole e fiori.

Intervallo di sicurezza: non necessario.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**

Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-333 2107947 (24H)

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039 0372 709900 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28/12/2012 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 01/10/2022