

# PRIDE® ULTRA

**Acaricida su piante ornamentali in serra**  
**Sospensione concentrata**

**Meccanismo d'azione: gruppo 21 (IRAC)**

## Composizione:

FENAZAQUIN puro: g 18.32 (200 g/L)  
Coformulanti q.b. a: g 100

## INDICAZIONI DI PERICOLO

H302+H332. Nocivo se ingerito o inalato.  
H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P261. Evitare di respirare gli aerosol.  
P264. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.  
P301+P312. IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere. P304+P340. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P391. Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.



**ATTENZIONE**

**Registrazione n. 8888 del 19.06.96 del Ministero della Salute**

## Titolare della Autorizzazione:

Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)  
Tel. 0546/629911



## Officine di Produzione:

SBM Formulation - 34535 Beziere - France  
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)  
Taglie: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 mL - 1 L  
Partita n. vedere sigla sovrainpressa

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Pericoloso per le api. Non utilizzare in presenza di api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non trattare in fioritura durante i periodi in cui la serra è parzialmente aperta. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare guanti e abbigliamento da lavoro prima di rientrare nell'area trattata. Per vite da tavola, per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di rispetto non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 m di ampiezza, oppure di 15 m di ampiezza associata all'impiego di dispositivi che riducano la deriva del 50%, oppure di 10 m di ampiezza associata a dispositivi che riducano la deriva del 75%, oppure di 5 m di ampiezza associata a dispositivi che riducano la deriva del 90%.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Consultare un centro antiveleli.**

## USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

PRIDE ULTRA è un acaricida dotato di rapida azione di contatto con efficace azione larvicida e adulticida nei confronti dei principali acari fitofagi e di alcune specie di Aleurodidi.

Si raccomanda di iniziare i trattamenti in presenza delle prime forme mobili.

**PRIDE®** Marchio registrato di Gowan Crop Protection Limited  
Fenazaquin sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited

In funzione del grado di infestazione applicare Pride Ultra esclusivamente in serra su:

**Crisantemo, garofano, gerbera, piante ornamentali, vivai di arboree ornamentali** per il controllo del ragnetto rosso (*Panonychus ulmi*) e del ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*).

Dose di applicazione: 100-125 mL (1-1.25 L/ha).

Volume di irrorazione: le dosi consigliate vanno diluite in 100 litri di acqua per attrezzature a volume normale e con applicazioni fino ad inizio gocciolamento.

Effettuare al massimo 1 trattamento all'anno.

Alle dosi sopraindicate, Pride Ultra possiede un'azione collaterale nei confronti degli aleurodidi delle serre (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*). Su colture floreali, ornamentali e vivai, iniziare i trattamenti in presenza delle prime forme mobili, eseguendo saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera superficie.

**Vite da tavola:** contro ragnetto rosso (*Panonychus ulmi*), ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*) e Eriofide dell'acariosi (*Calepitrimerus vitis*) ragnetto giallo (*Eriophyes vitis*) 40 mL/hL (0.4 L/ha)  
Effettuare al massimo 1 trattamento all'anno

**COMPATIBILITÀ:** il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.

**GESTIONE DELLE RESISTENZE:** per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare Pride Ultra con altri acaricidi aventi differente meccanismo d'azione.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**Periodo di sicurezza:** 28 giorni per la vite da tavola

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

**NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):**  
**CHEMTREC +1.703.527.3887**