

TOKRA®

Miscela fungicida antioidica sistemica e di contatto
Classificazione FRAC: 3 - Penconazolo; 11- Kresoxym metile
Tipo di formulazione: Microgranuli Idrodispersibili

TOKRA®

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16310 del

Composizione

Kresoxym-metile puro g 25
Penconazolo puro g 8,75
Coformulanti q.b. a g 100



23/10/2018

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P270 - Non mangiare né bere né fumare durante l'uso. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P305+351+338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+313 - In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ASCENZA ITALIA S.r.l.

Via Varese 25/G - 21047 Saronno (VA)
Tel: 02 84944669

Stabilimento di produzione: ASCENZA AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal - Portogallo

Taglia: 50 - 200 - 400 g 600 g; 1 - 5 kg

Partita n° vedi

corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali. Indossare guanti durante le operazioni di miscelazione e caricamento. Per l'applicazione usare guanti, indumenti adatti, stivali rigidi e protezione per occhi/viso. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non risulta completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi

Kresoxim metile: -----.

Penconazolo - Ingestione: disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, mal di testa, febbre, anoressia, depressione del sistema nervoso centrale. Inalazione: tosse, dispnea, riniti, aumento della secrezione di muco; Contatto: irritazione di occhi, cute e mucose, lacrimazione oculare, congiuntiviti, dermatiti da contatto.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

TOKRA® è una innovativa miscela fungicida a base di Penconazolo e Kresoxym-metile dotato di attività sistemica e di contatto specifico per il controllo dell'oidio o mal bianco e del marciume nero o Black-rot della Vite. In virtù dei meccanismi di azione dei due principi attivi, fra di loro assai differenti, TOKRA® non presenta alcun rischio di resistenza incrociata e pertanto si pone come una importante soluzione in chiave anti-resistenza laddove si siano verificate riduzioni di efficacia a carico dei tradizionali fungicidi triazolici.

Una volta applicato il prodotto agisce bloccando lo sviluppo delle malattie sia dall'esterno che dall'interno della pianta. Il Kresoxym-metile forma una barriera alla germinazione delle spore e alla penetrazione dei miceli, mentre il Penconazolo si ridistribuisce all'interno della foglia ove esercita una protezione endoterapica nei confronti del fungo che si estende ai tralci e alla giovane vegetazione in via di formazione. TOKRA® consente una protezione prolungata, anche in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli.

CAMPI DI IMPIEGO

Vite (uve da vino e da tavola): contro Oidio (*Uncinula necator*) e Black-rot (*Guignardia bidwellii*) impiegare il prodotto alla dose di 0,3-0,4 kg/ha con un volume di acqua compreso tra 200 e 1000 l/ha. Si raccomanda comunque di impiegare un volume d'acqua tale da garantire una completa bagnatura di tutta la vegetazione trattata, in modo particolare in presenza di forme di allevamento molto espanse e voluminose. TOKRA® si può impiegare dalla fase di sviluppo vegetativo (dalle 4 - 5 foglie sviluppate) fino a inizio maturazione (BBCH 15-85), con interventi medi ogni 12 - 14 giorni. Il prodotto presenta una ottima resistenza al dilavamento e permette una protezione della vegetazione del grappolo prolungata. Sono ammessi al massimo 2 interventi per ciclo vegetativo su vite per uve da vino e 3 su vite per uve da tavola.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, mentendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO