

# ELATUS® ERA

**Fungicida per frumento, farro, orzo, segale, avena e triticale**  
**Concentrato emulsionabile**  
**Benzovindiflupyr- Codice FRAC 7**  
**Protioconazolo – Codice FRAC 3**

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

benzovindiflupyr puro g 7,43 (75 g/l)  
protioconazolo g 14,9 (150 g/l)  
coformulanti q.b. a g 100

contiene: mixture of octanoic acid- decanoic acid- N,N-dimethylamide



**ATTENZIONE**

## INDICAZIONI DI PERICOLO

**H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/ i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

## SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 16384 del 27.11.2017

### Stabilimenti di produzione:

Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera)

Schirm GmbH – Schönebeck (Germania)

Chemark ZRT - Berhida - Peremarton Gyartelep (Ungheria)

Phyteurop - Montreuil-Bellay (Francia)

Syngenta Production France SAS - Aigues Vives (Francia)

SBM Formulation – Béziers (Francia)

Syngenta Chemicals B.V., Seneffe (Belgio)

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA – Paulina

(Brasile)

### Stabilimenti di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA)

### Stabilimenti di rietichettatura:

Anriv S.r.l., Ferrara (FE)

Sinteco Logistics S.p.a., San Giuliano Milanese (MI)

Partita n. vedi corpo della confezione

**Contenuto netto:** litri 1 - 3 - 5 - 10 - 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Indossare pantaloni e camicia a maniche lunghe, scarpe adatte, guanti durante la miscelazione e il carico del prodotto e durante la manipolazione di superfici contaminate. Si raccomanda di rientrare in campo quando la coltura è completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto vegetata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

## NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

## INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Terapia: sintomatica.**

**Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.**

## CARATTERISTICHE

ELATUS ERA è un fungicida in formulazione liquida composto dalla miscela di protioconazolo, fungicida triazolico, e di benzovindiflupyr, principio attivo appartenente alla famiglia degli inibitori della succinato deidrogenasi.

ELATUS ERA viene utilizzato per la lotta contro le malattie fungine dell'apparato aereo dei cereali a paglia.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

### FRUMENTO

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggini ( <i>Puccinia striiformis</i> <i>Puccinia recondita</i> ) Fusariosi della spiga ( <i>Fusarium spp.</i> )	1 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine fioritura
Septoriosi ( <i>Septoria tritici</i> <i>Septoria nodorum</i> )	0.75 – 1 l	
Fusariosi della spiga ( <i>Microdochium nivale</i> )		
Oidio ( <i>Erysiphe graminis f. sp.</i> <i>tritici</i> )		

### FARRO

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggini ( <i>Puccinia striiformis</i> <i>Puccinia recondita</i> ) Septoriosi ( <i>Septoria tritici</i> <i>Septoria nodorum</i> ) Fusariosi della spiga ( <i>Fusarium spp.</i> )	1 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine fioritura

### ORZO

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Maculatura reticolare e puntiforme ( <i>Pyrenophora teres</i> ) Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) Maculatura ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ) Ruggine ( <i>Puccinia hordei</i> ) Oidio ( <i>Erysiphe graminis f. sp.</i> <i>hordei</i> )	1 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine spigatura

### SEGALE

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggine ( <i>Puccinia spp.</i> ) Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	1 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine fioritura

### TRITICALE

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggine ( <i>Puccinia spp.</i> ) Septoriosi ( <i>Septoria spp.</i> ) Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) Fusariosi ( <i>Fusarium spp.</i> )	1 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine fioritura

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 febbraio 2023

## AVENA

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggine ( <i>Puccinia coronata</i> )	1 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine spigatura

Applicare il prodotto con un volume di 100-400 l/ha di acqua.  
Il volume di acqua varia in funzione delle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione.

### STRATEGIA ANTIRESISTENZA

ELATUS ERA è un prodotto a base di benzovindiflupyr, sostanza attiva appartenente al gruppo 7, e di protioconazolo, sostanza attiva appartenente al gruppo 3 secondo la classificazione del FRAC (Fungicide Resistance Action Committee). Per evitare la selezione di ceppi di funghi resistenti ai due meccanismi d'azione, si raccomanda di applicare il prodotto preventivamente e di seguire le linee guida FRAC specifiche per colture e patogeni.

### PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- Riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione l'agitatore. In alternativa usare apposito pre-miscelatore.

### DOPO L'APPLICAZIONE È BUONA PRATICA PULIRE L'ATTREZZATURA CON ACQUA ED UN IDONEO DETERGENTE.

**Compatibilità:** in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

**Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 febbraio 2023**